

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه:

برای دریافت درجه دکتری

عنوان پایان نامه:

درمان غیرجراحی شکستگیهای کندیل فک پایین

Non Surgical management of the Condylar fracture

استاد راهنما:

آقای دکتر خراسانی

نگارش:

الهام جوادی

خلاصه و نتیجه گیری:

از آنجا که شکستگی کندیل از شیوع بالایی برخوردار است و با توجه به مشکلاتی نظیر انکیلوز، اختلال رشدی و اختلال عملکرد مفصل که می‌تواند در نتیجه عدم درمان یا درمان نامناسب ایجاد شود، شکستگی این ناحیه از اهمیت خاصی برخوردار است.

از نظر انتخاب روش درمانی مناسب، با توجه به مطالب یاد شده، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که درمان غیرجراحی و محافظه کارانه در اکثر موارد به عنوان انتخاب اول است. البته در صورتیکه مواردی مانند جابجایی شدید در جهات فوقانی، جانبی یا خلفی وجود نداشته باشد. از نظر مقایسه نتایج درمانی به دو روش جراحی و غیر جراحی چنین برمی‌آید که مشکلات بعدی در روش غیرجراحی، در اکثریت موارد معمولاً پیش نمی‌آید.

طول مدت *IMF* و بی حرکت سازی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است که باید به آن دقیقاً توجه شود. پی‌گیری مجدد بیماران درمان شده به روش غیرجراحی نیز بسیار اهمیت دارد تا به محض مشاهده مشکلات احتمالی بعدی اقدام به درمان به موقع و مناسب شود.

روش جراحی بدلیل پتانسیل ایجاد مشکلات بعدی و نیز نیاز داشتن به امکانات خاص و ویژه و هزینه درمانی بالا، جز در مواردی که نتوان از روش غیرجراحی استفاده کرد، توصیه نمی‌شود.